

Date de mise en œuvre et lots supplémentaires
2010

Pourcentage du paquet couvert

Les mises en garde sanitaires doivent couvrir 65 % de la face avant et 43 % du dos des emballages des produits du tabac, y compris de la bordure. En tout, 54 % de la surface externe du paquet sont réservés aux mises en garde sanitaires.

Calendrier de rotation et historique

Quatorze mises en garde sanitaires sont utilisées sur les paquets de cigarettes.

Restrictions relatives aux informations trompeuses

Non précisé.

ÉTIQUETTES DE MISE EN GARDE

2010

 <p>Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır</p>	 <p>Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur</p>	 <p>Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve size en yakın sağlık ocağından yardım isteyin</p>	 <p>Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir</p>
 <p>Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın</p>	 <p>Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojenasiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulur</p>	 <p>Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir</p>	 <p>Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir</p>
 <p>Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın</p>	 <p>Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur</p>	 <p>Sigara içenler genç yaşta ölür</p>	 <p>Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur</p>
 <p>Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur</p>	 <p>Sigara içmek spermilere zarar vererek doğurganlığı azaltır</p>		