

DATOS SOBRE EL PROBLEMA DEL TABACO MÉXICO



México ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco el 28 de mayo de 2004.

CONSUMO DE TABACO

- En México, 16.4% de los adultos (mayores de 15 años) son fumadores actuales de tabaco (hombres 25.2%; mujeres 8.2%).¹
- Entre los jóvenes (de 13 a 15 años) en México, el 14.6% actualmente fuma cigarrillos, con poca diferencia entre géneros (hombres 15.8%; mujeres 12.9%).²
- En 2015, se consumieron más de 35 mil millones de cigarrillos en México.³

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO

No existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.⁴

- El 17% de los adultos se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en su lugar de trabajo, el 25.8% en los restaurantes y el 25.9% en el transporte público.¹
- En México, el 44.6% de los jóvenes (de 13 a 15 años) se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en los espacios públicos, mientras que el 33.3% se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en el hogar.²

CONSECUENCIAS A LA SALUD

El uso del tabaco es mortal. Fumar tabaco mata al menos a la mitad de las personas que fuman durante toda su vida.⁵


- Más de 43,000 mexicanos mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.⁶
- 5.5% de todas las muertes en México son atribuibles al humo de tabaco.⁶
- Cerca de 100,000 pacientes por año demandan servicios de atención a la salud para tratar enfermedades relacionadas con el tabaco.⁷

COSTOS PARA LA SOCIEDAD

El tabaco demanda un gran costo a la sociedad.


- En 2008, los costos de la atención de la salud por el tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco en México se estimaron en 75.2 mil millones de pesos (5.7 mil millones de dólares estadounidenses). Esta estimación supone que los costos de los tratamientos de las enfermedades relacionadas con el tabaco representan el 10% de todos los costos de atención a la salud.⁸
- Según un estudio realizado en el Instituto Nacional del Cáncer de México en 2009, el costo médico anual promedio atribuible al tabaco por un paciente de cáncer de pulmón era de 92,269 dólares estadounidenses.⁹

ADULTOS FUMADORES DE TABACO (MAYORES DE 15 AÑOS)




FUENTE: GATS, 2015

JÓVENES FUMADORES DE CIGARRILLOS (DE 13 A 15 AÑOS)



FUENTE: GYTS, 2011

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO EN ADULTOS (MAYORES DE 15 AÑOS)



FUENTE: GATS, 2015

1. Global Adult Tobacco Survey Mexico 2015. (Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos México 2015). Available from: omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/gats2015/ENCUESTA_GATS_2015.pdf
 2. Mexico Global Youth Tobacco Survey (GYTS). National, 2011. Available from: nccd.cdc.gov/GTSSData/default/default.aspx.
 3. Euromonitor International, 2016.
 4. U.S. Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A Report of the Surgeon General. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2006. Available from: cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/index.htm.
 5. Eriksen M et al. The Tobacco Atlas. Fifth Ed. Atlanta, GA: American Cancer Society; 2015.
 6. Pichon-Riviere A, Reynales-Shigematsu L M, Bardach, A, Carporale J, Augustovski F, Alcaraz A, Caccavo F, Sáenz, de Miera-Juárez B, Muñoz-Hernández J A, Gallegos-Rivero, V, Hernández-San Román E. Carga de Enfermedad Atribuible al Tabaquismo en México. Documento Técnico IECS No. 10, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, Buenos Aires, Argentina, Agosto de 2013 (www.iecs.org.ar).
 7. Arredondo A et al. Economic burden of expected epidemiological changes in diseases related to tobacco. Rev Saúde Pública. 2007; 41(4):523-9.
 8. Waters H et al. The Economics of Tobacco and Tobacco Taxation in Mexico. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2010.
 9. Arrieta O et al. Medical care costs incurred by patients with smoking-related non-small cell lung cancer treated at the National Cancer Institute of Mexico. Tobacco Induced Diseases. 2015;12(25).