

Fecha de implementación y rondas adicionales
2010

Cobertura del paquete

Las advertencias sobre la salud deben cubrir el 65% del frente y el 43% del dorso del paquete, incluidos los bordes. En total, el 54% del espacio del paquete está destinado a las advertencias

sobre la salud.

Cronograma de rotación e historia

Se utilizan catorce advertencias en los paquetes de cigarrillos.

Restricciones sobre la información engañosa

Sin especificar.

ADVERTENCIAS

2010

 <p>Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır</p>	 <p>Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur</p>	 <p>Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve size en yakın sağlık ocağından yardım isteyin</p>	 <p>Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir</p>
 <p>Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın</p>	 <p>Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojenasiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulur</p>	 <p>Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir</p>	 <p>Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir</p>
 <p>Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın</p>	 <p>Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur</p>	 <p>Sigara içenler genç yaşta ölür</p>	 <p>Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur</p>
 <p>Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur</p>	 <p>Sigara içmek spermilere zarar vererek doğurganlığı azaltır</p>		