

### Data de implementação e rodadas adicionais

2009, 2011

### Cobertura da embalagem

As advertências de saúde precisam cobrir 50% da frente e 50% do verso das embalagens. No geral, 50% do espaço da embalagem é reservado para advertências de saúde.

### Frequência de rotação e histórico

Duas advertências de saúde são usadas nas embalagens de tabaco. O Irã produziu duas rodadas de rótulos de advertência. A primeira rodada foi implementada em 2009. Um segundo conjunto com 2 advertências de saúde foi implementado em 2011.

### Restrições sobre informações enganosas

Descritores enganosos, como "light" e "suave", são proibidos de figurarem nas embalagens.

## ADVERTÊNCIAS

## 2011



## ADVERTÊNCIAS

## 2009



مصرف سیگار از عوامل عمده بروز سرطان دهان و لب می باشد. این نوع سرطان مشکلاتی در جویدن و بلعیدن ایجاد می نماید

استعمال دخانیات سبب بروز اسب های جدی به مخاط دهان و زبان و در نهایت سرطان زبان می شود

مواجهه با دود سیگار، فلان و مواد دخانی مصرف شده توسط والدین و اطرافیان باعث ایجاد و تشدید بیماریهای تنفسی، آسم و عفونت گوش میانی می شود



استعمال دخانیات سبب اسب های جبران ناپذیری به بافت چشم، اعصاب مرکزی بنایی و در نهایت کوری می شود.

افراد سیگاری ۳ برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری در معرض خطر ابتلا به انواع سرطانهای پوست هستند