

**Data de implementação e rodadas adicionais**  
2010

**Cobertura da embalagem**

Incluindo a borda, as advertências de saúde precisam cobrir 65% da frente e 43% do verso das embalagens. No geral, 54% do espaço da embalagem é reservado para advertências de saúde.

**Freqüência de rotação e histórico**

Quatorze advertências são usadas nas embalagens de cigarros.

**Restrições sobre informações enganosas**

Não especificado.

## ADVERTÊNCIAS

2010

 <p><b>Sigarayı bırakmak</b> ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır</p>	 <p><b>Sigara içmek cildin</b> erken yaşlanmasına neden olur</p>	 <p><b>Sigarayı bırakmak için</b> doktorunuzdan ve size en yakın sağlık ocağınızdan yardım isteyin</p>	 <p><b>Sigara içmek</b> ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir</p>
 <p><b>Sigara içmek yüksek</b> derecede bağımlılık yapar, başlamayın</p>	 <p><b>Sigara dumanında benzen,</b> nitrozamin, formaldehit ve hidrojenasiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulurur</p>	 <p><b>Hamile iken</b> sigara içmek bebeğe zarar verir</p>	 <p><b>Sağlık kuruluşları</b> sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir</p>
 <p><b>Çocukları koruyun:</b> Dumanınızı onlara solutmayın</p>	 <p><b>Sigara içmek damarları</b> tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur</p>	 <p><b>Sigara içenler</b> genç yaşta ölür</p>	 <p><b>Sigara içmek kan akışını</b> yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur</p>
 <p><b>Sigara içmek</b> ölümcül akciğer kanserine neden olur</p>	 <p><b>Sigara içmek</b> spermilere zarar vererek doğurganlığı azaltır</p>		