



TÜTÜN SORUNU İLE
İLGİLİ RAKAMLAR

TÜRKİYE



Türkiye, 31 Aralık 2004 tarihli DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Tütün Kontrolü konulu Çerçeve Sözleşmesini kabul etti.

TÜTÜN TÜKETİMİ

- Türkiye’de yetişkinlerin %31,6’i (15 yaş üzeri) tütün mamulleri kullanıyor.¹
 - Erkeklerin %44,1’i ve kadınların %19,2’i tütün mamulleri kullanıyor.
- Gençlerin (13–15 yaş):²
 - %17,9 bir tütün mamulü kullanıyor (erkeklerin %23,2’ü; kızların %12,1’i)
 - %7,7’ü sigara içiyor (erkeklerin %9,9’i, kızların %5,3’ü), ve %12,8’i başka tütün mamulleri kullanıyor (erkeklerin %17,3’si; kızların %8’si)

PASİF İÇİCİLERİN MARUZ KALDIKLARI

Pasif içiciler de tehlikede.³

- Kapalı mekanlarda çalışan yetişkinlerin yaklaşık %10,6’sı (15 yaş üzeri) iş yerinde sigara dumanına maruz kalıyordu. Bunların %12,7’ü restoranlarda ve %28’si cafe’lerde çalışanlar.¹
- Gençlerin %51,8’si (13–15 yaş) kamusal alanlarda ve %46,1’si evde pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalıyor.²

SAĞLIĞA ETKİLERİ

Tütün mamullerini kullanımının ölümcül sonuçları vardır. Tüm hayatları boyunca sigara içenlerin yarısı bu nedenle hayatını kaybediyor.⁴


- Her yıl 85.000 civarında Türk, sigara içmeyle alakalı hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmektedir.⁵
- Türkiye’deki erkek ölümlerinin %29,2 ve kadın ölümlerinin %8,2’si tütünden kaynaklanmaktadır (toplamda %21,1).⁵
- Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan her beş ölümden biri, ayrıca kronik solunum hastalıklarından kaynaklanan tüm ölümlerin yarısı ile trake, bronş ve akciğer kanserlerinden kaynaklanan ölümlerin dörtte üçünden fazlası tütüne dayandırılabilir.⁵

TOPLUMA MALİYETİ

Tütün mamullerinin topluma maliyeti çok yüksek.


- Türkiye’de sigara içenler her yıl tütün mamullerine 18 milyar TL (6,2 milyar USD’den fazla) harcıyor.⁶
- Ülke genelinde yıllık sağlık harcamalarının %9’u (966 milyon USD’den fazla)tütün mamulleri ile ilgili hastalıklar nedeniyle yapıyor.⁷
- Sigara içenler aylık bütçelerinin yaklaşık %8’ini sigaraya harcıyor ve düşük gelirli harcama %10,7 oluyor.⁷

YETİŞKİNLERDE TÜTÜN MAMULÜ KULLANIMI (15 YAŞ ÜZERİ)




KAYNAK: GATS, 2016

GENÇLERDE TÜTÜN MAMULÜ KULLANIMI (13–15 YAŞ)



KAYNAK: GYTS, 2017

PASİF İÇİCİ YETİŞKİNLER (15 YAŞ ÜZERİ)



KAYNAK: GATS, 2016

1. Turkey Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2016. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Available from: www.cdc.gov/tobacco/global/gtss/gtssdata/index.html. 2. Turkey Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2017. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Available from: www.cdc.gov/tobacco/global/gtss/gtssdata/index.html. 3. U.S. Department of Health and Human Services. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report of the Surgeon General. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention;2006. Available from www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/2006/index.htm. 4. World Health Organization. Tobacco: Key facts. Updated May 27, 2020. Available from www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco. 5. Global Burden of Disease (GBD) 2017. Seattle, WA: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington;2019. Available from: <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>. 6. Bilgic A, Yen S. Household alcohol and tobacco expenditures in Turkey: A sample-selection system approach. Contemporary Economic Policy. 2015 July;33(3):571-585. 7. San S, Chaloupka F. The impact of tobacco expenditures on spending within Turkish households. Tobacco Control. 2015 August;0:1-6.